PROTOKOL ZA prehranu dojenčadi i male djece u kriznim situacijama (IYCF-E) u prihvatno-tranzitnom centru Slavonski Brod

Prisutna dojenčad i mala djeca (0-24 mjeseci)

ZA SVE KOJI PRUŽAJU PODRŠKU: Ohrabriti staratelje; pružiti privatnost, ne dopustiti muškarcima ulazak u Prostor za majke i djecu; pobrinuti se za stariju djecu i biti svjesni rizika razdvajanja obitelji

Osnovna procjena
1. Koliko je dijete staro?; 2. Da li dijete doji? ; 3. Dobija li dijete još nešto za jelo/piće? ; 4. Ima li majka problema s dojenjem?

ZDRAVSTVENI PROBLEMI → Uputiti pedijatru

KOMBINIRNA PREHRANA (DOJENJE I FORMULA)

PREHRANA FORMULOM (nije dojeno max 2 tjedna)

PREHRANA FORMULOM (nikad dojeno)

DOJENO

Dati ključne poruke Naglasiti: sigurnije je i zdravije dijete samo dojiti; Prednosti majčinog mlijeka nasuprot mliječne formule

RODA roditelji u akciji | Save the Children

Podržati prelazak na dojenje

RODA roditelji u akciji | Save the Children

→ **Relaktacija**

→ **PRIVREMENA podjela gotove mliječne formule** — Vidi protokol u nastavku

Slijedi upitnik za gotovu mliječnu formulu, Je li majka voljna za relaktaciju?

→ **DA** → Podržati prelazak na dojenje

→ **NE** → **Podjela gotove mliječne formule u punoj količini** — Vidi protokol u nastavku

CILJANA podjela gotove mliječne formule

U ODVOJENOM PROSTORU:
Podržati ispravno i higijensko uzimanje formule; promovirati hranjenje čašom

Save the Children

Promovirati hranjenje čašom! Ako nije moguće: sterilizirati bočice i dude; zamijeniti prljave bočice.

Bilo koji problemi?

Save the Children | RODA roditelji u akciji

Pružiti ključne poruke i osnovnu pomoć za dojenje

- Majka je iscrpljena ili bolesna
- Percipira nedostatak mlijeka
- Poteškoće u pozicioniranju
- Nelagoda ili bol u području dojke ili bradavice
- Prehrana nije prikladna uzrastu djeteta

Psihosocijalna podrška

- Majka je u jakom stresu, emocionalnoj krizi ili odbacuje dijete

Stručna podrška u dojenju ili medicinska podrška

- Niska porođajna/tjelesna težina djeteta
- Dojenče vidno mršavo ili pothranjeno
- Dojenče odbija sisati
- Jaka ili trajna bol u području dojke i/ili bradavice
- Stanje dojki

Stručna podrška u dojenju i PRIVREMENA podrška formulom

- Majka je bolesna ili privremeno u nemogućnosti da doji (rijetko)
- Dijete je bolesno i privremeno ne može sisati

Pruži ključne poruke